



## PÔSTER

### *Cuidado individual, familiar e comunitário*

#### **Prevenção do câncer cervico uterino: fatores para a não realização do exame**

Aliandro Willy Duarte Magalhães. Centro Universitário do Pará (CESUPA). awdm1@hotmail.com  
 Jefferson Maia Franco. Centro Universitário do Pará (CESUPA). francomilitar@hotmail.com  
 Vanessa Fernandes de Brito. Centro Universitário do Pará (CESUPA). fbritovanessa@gmail.com  
 Ellen Maria Sampaio Xerfan. Centro Universitário do Pará (CESUPA). ellenxerfan@gmail.com  
 Anna Paula Santos Pinheiro. Centro Universitário do Pará (CESUPA). annap\_sp@hotmail.com

**Introdução:** O câncer do colo do útero corresponde, aproximadamente, a 15% de todos os cânceres que ocorrem no sexo feminino. Seu pico de incidência situa-se entre os 40 e 60 anos de idade, sendo pouco frequente abaixo dos 30 anos.

Estima-se que cerca de 40% das mulheres Brasileiras nunca tenham sido submetidas ao exame citopatológico (Papanicolaou).

**Objetivos:** Identificar os fatores que influenciam a não realização do PCCU na Unidade Saúde da Família CN VI, Ananindeua – PA, no período de abril a outubro de 2010.

**Metodologia ou Descrição da Experiência:** O estudo foi analítico-descritivo, desenvolvido no período de abril a outubro de 2010, na Unidade Saúde da Família Cidade Nova VI, Ananindeua, Pará. Amostra de 200 pacientes, selecionados de forma aleatória. A identificação foi procedida por meio dos cadastros do Programa Saúde da Família. Critérios de inclusão: ter entre 20 a 60 anos de idade, do sexo feminino e assinar um termo de consentimento informado. Critérios de exclusão: pacientes virgens, menores de 20 anos ou maiores que 60 anos ou submetidas a histerectomia total. A coleta de dados foi realizada na Unidade Saúde da Família Cidade Nova VI, Ananindeua, Pará, por meio de entrevista semi-estruturada (Instrumento 1).

**Resultados:** Entre os motivos apontados para a não realização do exame, foram referidos com maior frequência, a dificuldade na marcação, a falta de conhecimento das mulheres acerca da realização do exame, o medo, a vergonha, e o sentimento de angústia frente à realização do exame. A escolaridade e o nível socioeconômico das mulheres também foram apontados como determinantes da não realização do exame de papanicolaou.

**Conclusão ou Hipóteses:** Dessa forma, é necessário fazer estudos locais com as pacientes da área de abrangência do PSF CNVI, tendo como variáveis direcionadoras os resultados dos estudos analisados neste trabalho, evidenciando a necessidade de ampliar as atividades educativas, colocando a importância da realização do exame e o rastreamento pela busca ativa das mulheres na faixa de idade preconizada.

**Palavras-chave:** Câncer Cervico Uterino. Papanicolaou. Exame.