

## PÔSTER DIGITAL

### *Outros temas relacionados à Atenção Primária e Medicina de Família e Comunidade*

#### **Associação entre uso parental de drogas e funcionamento familiar e infantil**

Vinicius Noschang. Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). [viniciuscnoschang@gmail.com](mailto:viniciuscnoschang@gmail.com)

Bruna Seibel. Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). [brunaseibel@gmail.com](mailto:brunaseibel@gmail.com)

Murilo Henzel. Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). [murilohenzel@hotmail.com](mailto:murilohenzel@hotmail.com)

Carmen Fernandes. Grupo Hospitalar Conceição (GHC). [carmenlcfernandes@gmail.com](mailto:carmenlcfernandes@gmail.com)

Olga Facelto. Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). [olgafacelto@gmail.com](mailto:olgafacelto@gmail.com)

**Introdução:** Estudos indicam que o uso de álcool e substâncias psicoativas pelos cuidadores está relacionado à adesão por adolescentes a esse comportamento e que uma em cada quatro crianças e adolescentes está exposta ao abuso de álcool no ambiente familiar. Um dos fatores de risco para o desenvolvimento de alcoolismo seria a inserção em contexto familiar com abuso de álcool.

**Objetivos:** Verificar em uma amostra populacional Brasileira se o uso de álcool e cigarro pelos pais ou cuidadores está relacionado à qualidade do funcionamento familiar e ao desenvolvimento de seus filhos em idade escolar, em busca de melhor compreender como ocorrem essas associações.

**Metodologia ou descrição da experiência:** Os dados analisados são um recorte de uma pesquisa longitudinal, com quatro tempos de coleta ao longo de 10 anos. A amostra inicial, representativa da população Brasileira, foi constituída por todas as famílias do bairro Vila Jardim que tiveram filhos em hospital público durante o ano de 1999, totalizando 148 famílias. Este é um estudo transversal referente ao quarto tempo de coleta, quando os filhos tinham aproximadamente 9 anos. Os instrumentos utilizados foram GARF, GARF-Adaptado, CGAS, SRQ, DSM-IV-TR Checklist e CAGE, além de informações extraídas de avaliação clínica sobre uso de substâncias psicoativas.

**Resultados:** Nas famílias estudadas nesta etapa (n=82), encontrou-se que 9 cuidadores abusavam de álcool, 31 de tabaco e 3 de drogas ilícitas (amostra insuficiente para análise). Houve correlação significativa entre o abuso de álcool e disfunção familiar ( $p<0,05$ ), conjugal ( $p<0,05$ ) e tendência a associação com disfunção infantil ( $p=0,06$ ). O uso de tabaco mostrou associação com disfunção familiar ( $p<0,01$ ), conjugal ( $p<0,01$ ) e infantil ( $p<0,05$ ). Das variáveis de controle analisadas, apenas condições de moradia se associaram com abuso de álcool ( $p<0,01$ ). Esperava-se encontrar associação entre o abuso de substâncias e outros transtornos mentais, o que não foi evidenciado neste estudo.

**Conclusões ou hipóteses:** Os resultados estão de acordo com a literatura, indicando associação entre abuso de substâncias psicoativas e dificuldades no funcionamento familiar e no desenvolvimento infantil. Os resultados com o tabaco são um dado de alerta ao sistema de saúde.

**Palavras-chave:** Family Functioning. Drug Abuse.